

**DE TABE INFANTILI
DISSERTATIO
INAUGURALIS
QUAM ...MENSE
SEPTEMBRIS 1840...**

Costantino Persevali



DE
TABE INFANTILI

Dissertatio Inauguralis

QUAE

AGNOUITUR

PRÆLATIO AUCTORIS MICHAELIS PERSEVALLI

OPUSCULO DIGNO REGNO

DE LIGURIBUS S. J. PONTIFICATUS

AUSPICE

D. JO. MARIA ZENDEINI

RESPONSE PATRICII EPOL. P. O.

Ad Medicinæ Lauream

RITE ASSEQUENDAM

IN S. R. UNIVERSITATE TORINENSE

UNA CUM THESIBUS PROPOGANDIS

Torinæ Septembris 1840

PUBLICAE INQUISITIONI SUBMITTE

PERSEVALLI COSTANTINUS

PALATIOLI ERIXIENSIS.



TORINÆ REGNI
EX TYPOGRAPHIA GAZZONI

1840



OPTIMIS PARENTIBUS



PROOEMIUM.

Scholasticis curriculo absoluto, ad
 medicinae lauream adipiscendam aliquid
 de medicis rebus disertare coactus se-
 ligeram clamo-rem vestitum, conscripse-
 ram jam quomodo a moribus et a luxu,
 a capite ad pedes, partes omnes cor-
 poris deturparentur, quomodo diversi-
 mode et contra salutem omnes natio-
 nes mundi induerentur; sed fuisset ni-
 mis longa et forsan quoque tædiosa
 disertatio; mutavi ergo consilium, et
 velocissimo calamo, nonnulla dicere de
 Tabæ Infantili opportunum credidi. Qua-
 lescentque fuerint istae pagellæ, grato
 animo accipite lectores, et si quid tam
 brevi tempore pro vestro emolumento
 dixerim satis superque, me dicam be-
 tum.

DE TABE INFANTILI.

Tabes infantilis, seu infantilis atrophia, atrophis mesentericis, aut glandularis, aut, ut aliis placet, periatrophia, dicitur illa tabes abdominalis speciei, quae infantes adgreditur, a tertio usque ad quintum et septimum aetatis suae annum: raro tardius, frequentius e contra citius, dum etiam quatuordecim, vix post octavum, si debile, et acrofalcis dispositus morbus est infans.

Incipit morbus iste plerumque post remissionem infantis a lactatione: ejus decursum chronicum difficillime potest exponere, quia in diversis gradibus dividitur. Tria generatim admittuntur stadia: 1. Tabis incipiens; 2. Tabis confirmatae seu fixae haecione; et 3. denique Tabis absolute, seu stadium colliquationis. Lente haec tria stadia decurrunt, di-
versis comitata symptomatibus semper morbum graviterem reddentia, donec totum corpus ad pellem et ossa unice reductum, miserrime per viam salutis.

Ut autem hujusce morbi perfectio habetur cognitio, opus est omnia lente observare phaenomena, quae distincta sub studiis occurrunt.

Stadium primum.

Infantes, qui antea erant infantes, tranquilli ac robusti, vix incipiente morbo, inquieti, nervosi, melancholici, et facile laceries fiunt, inquieti sunt coram seculi, diarrhoea quandoque, quandoque aliqui laborant. Iamminatur adpessus in primis, et temperis progressu adaugretur, et talis sit ut rareret evadant, sine causa alii, alii lapsum adgrediantur, et quod mirabile est ferientes appetunt cibos, dum e contra cuncta aliisque alimenta fugant; stiles est intestas, imperfecta digestio, gutturalia quandoque laborant, et non raro enteralgia unde diversa abdominalis doloribus cruciati corpus contollunt. Mala alimentorum peracta digestionem, alimenta vix coacta per anam exant, henteris ipsi obstruunt, necesse sunt per diarrhoeam, aut bilis, et non raro vomitu.

Pallidit valias, carnes relaxantur, debilesque fiunt, et quandoque nec sponte, nec voce moventur, nec quicquid, insidant continet matris in brachis, fistulas ploribusque parentibus ejus cor crudeliter dilanant.

Per duas vel tres hebdomadas haec symptomata perdurant, et si mater videlicet morbos causam amovet, ac dieteticas condiciones mutat, acri sensu sensimque morbos evanescit; dum e contra si mater suppositum

8

negligit, quam hypochondria tenuis fuit, adhaerens corpori volumen acquirit et sic pedetentim desinit morbus ad

Secundum Stadium.

Sed quo magis magisque viscera omnia volumine adaugentur, et talem sensibilitatem acquirunt ut super ea nequidem minimis pressio exerceri possit quin gravissimo dolore affligantur.

Præter hepate et lien, glandulas quoque mesentericas intumescunt ut nulla remaneat voluminis proportio obdorem inter et faciem et extremitates; illa primis jam debet emaciata rugosa et sensu evadit; intus lurida, attentata et flaccida cute teguntur.

Tenuis et pallida exsilianter urinae cito turbidae, inodore generantur, sed quandoque una cum alio et transpositione acidulam emittunt odorem.

Sæpe dorsum adparet sic dicti comedones, a vulgo verruci et morbi causam retenti, qui tamen nil sunt nisi humoris indurati, a subactis glandulis secreti collectiones.

Generatim sub hoc studio tibi intestinalis phlegmæ cæter, quæ nec levissimum pressionem sustinet.

In morbi progressu emaciationis symptomata cum scrofulis agnis hinc inde obser-

‘tastis; glandulas cervicales jugulares, et linguales turgentur, nec rachidæ pharyngeæ debent.’

Fuente morbo oritur hæc febrix, cæcitudo clausa est alvus, et viscerum crementis aliâ opportunitas in scenam venit physis tuberculæ, et singulæ quoque meningitis et encephalitis apparent, quibus hydrocephalus subsequitur. Colliquatio denique incipit decursum ægrotantis remari extremis vitæ diebus.

Stadium tertium.

Effrenis diarrhoea et colliquatæ sedes, cum febre depauperenti ad ultimam macilentiam gradum redeunt infensam; corpus os est repletum aliis ulceribusque, et conjunctiva et tota-cutis echymomatosis punctulis obdacta; hydrotorax, scitis anasarca demum ulcibus aperta morientique prædicant.

Ætiologia.

Solent medici tabis infantilis causas in disponentes et occasionales distinguere. — Inter primas, congenita debilitas, et morbi peritæ congeniti organum digestivum, et præcipue diarrhoeas acrolasias recensent; nec sunt obliviscendas dispositiones congenitas a parentibus rachitidis, syphilitidis, mæstris-

tu a senectute, et illae a gestatione repleta phisicis moribusque malis.

Inter causas occasionales sunt alimenta ferinae, cruda, traseia, ante opportunitatem tempus vel nimis in quantitate porrecta; aut si elementa sunt bonae qualitatis, ventriculus ad eas continuas narcoticorum, catharticum, emeticum, et debilitandum, nec non ab oryza et milibus mortuus narratur; alias sunt motus excessus, prospertes, humidae frigidae et obacuae habitationes, aer aut males indolis saepe natura, aut vitiosum immutatus.

Hae tabis species vero non solum infantibus, sed si acrofulea viget diathesis adultis quoque supervenit; et tanto magis ubi enteritis datur vita, aut inter coepulas, aut corpus continas curabam feratur ad manum augenda, aut per trapiam, vel cutis poris molliculus preparatorum plantis coepes ingrediantur.

Si porro minus ubi infans, et ille hac tabis specie corripitur potest ubi casus incurrit disponentibus ubi essent hic materiam degeneratam, alimentorum deficientia, liquorum spirituosorum usus, cellaceae, purgantium narcoticorum et prosterilis opii, aut ejus communissimo preparato minus frequenter et locuste a matribus porrecto laqueis infantibus, scilicet theriaca, abusa.

Alias causas sunt immediatas, uti reli-

quere infantes in excrementis, non rectare linteis nec vestes, lebes continuas, et cunctasque diarrhoeas a dentitione productas.

Constatum generationis tabes infantilis esse rachitide et scrofula; si quaeritur tamen quanam sit infans huiusce morbi conditio, facile augetur ubi attente omnia symptomata perpendantur quibuscum se et hic morbus manifestat. Aptè pensatis phenomenis videtur esse universalis corporis consumptionem, quod comprobatur quoque a diversis cadaverum autopsiis, diversis vicibus percussis. Nobili de Raimona ait, in cadaverum sectione mortuosam per tabem infantilem semper invenisse glandulas mesentericas tumidas, rubras, lymphaticas materia repletas, aut caeras, aut lardaceas, aut purulenta. Hepar voluminosum, molle, aut a contra parvum durum, et hinc inde scirrhusum, oblitumum bile tenui repletum, osentum et rursus absque pinguedine, intestina pallida relaxata hinc inde aere, una cum moco et vermibus distenta.

Admittendum porro quod precipue alteratio est in hepate et glandulis mesentericis quae primitus et agnoscuntur esse functiones perturbantur.

Propositi.

Propti diuina est causarum indoles, utia et aegrotantis constitutio, propti diuina est aedificatio dispositio, propti aëris telluris et alimentorum est conditio, bona gravis aut grauioribus est prognosa.

Fueritibus cunctis circumstantiis facillime infans auitatibus recuperet; notandum tamen quod ipsi continis matris cura, mater optimeque regimen difficile saltem ament, quae utrum a simpliciis parentibus dicit.

Sollicita causarum auitio, utilis, ut ita dicam, materis credulitas optima cibum firmacrum, et perpetuam statumem infanti de-regere, sunt paritipam aduicantia habenda a quibus salus abientia repeti debet.

Aliae feruntur circumstantiae sunt noctis aëris, ejus electricitas, rigor uiae organice, morbi lentitas; et lentio: ejus progressa.

Therapia.

Varia enim solet prout diversum est morbi stadium. In primo, remediis necessitibus curata, per solas naturales vires seget sanatur, simplex est enim morbus; dum e contra ad secundum stadium erectus ne quidem ab apta medela destrui potest, inflammationes nempe abdominis aut pectoris, aut denique cerebri brevi tempore infantem erocant.

Nonnulla in earibus phenomena orientur phthisis pulmonalis, aut Hydrocephali et per diros extructus seget misere expirat etiam apta adhibita cura.

Opportunum sunt curata incipere quando florentes omnes circumstantiis advenit, opus est in primis, humidus, obscurus, frigidusque derelinquere habitationem, motu carceri, aptiusque vacui alimenta. Si lactem adhuc agit infans, sit bonae nutritio, et mater ipse lactationem incipiat et ad ultimum finem perducit, hoc est sacrum munus quod ceteris aequa fore ab omnibus matribus spernitur: si vero mater nequit, nec nutrit apta invenitur ad hoc animale praesertim necessarium et acutissimum deveniendum est.

Robusti infantes aut bene solo lacte animali sustentari possunt: si debili est infans tunc aptam nutritio lacte salubrem occupare quaerit.

Temporis progressu, infans a lacte depulsa, mater, ad alimenta facilia digestioria, et modice nutrientia, non in saberrum nec in aciditatem prona, demittit.

Convenit panis luscusculus in pulverem reductus, aqua coactos et lacte dilutas, hoc pale nunquam congruit infantibus; melior adhuc si cum junculo peracta, non salita sed saccharata fuerit.

Ad destitutionem perventus, infans optime inveniet juncula magis densa ad pulvem conficiendam cum bordeo decoctio, cum oryza, vitello ovorum, alimonia quoque conveniant farinacea sed parva in copia, tunc enim ventriculus sat viam habet, ut substantia non effluantur, deinde carnes teneras porrigi possunt.

Aqua simplex sed bonae notae sit pro potu, primis diebus precipue, nec deinceps coactum vino etiam bonae notae nisi ad aliorum rationem siteger adveniat.

In primis vitus cum aqua conjungi deinde porcum sed parva in copia porrigi debet.

Si jam incipit atrophie nunquam conveniant pulveres ex glandulis quoniam lacte conjunctis, utilitatem cui hoc remedium etiam in eo studio sub quo phthisis manifestatur.

Sendere aut infantem cum pulvere laticem glandularum, alii e contra cum glandulis co-

predictis decoctionis sed non substantie decoctionem cum lacte efformant.

Sitis intensam cum oryza, vel subsp, vel panis liacoeti decocto sedanda. Potio nimis aquosa in pueris tale deturto diarrhoeam gignere solet, quae ubi jam parva sit, aut supradictis potibus, aut albo Sydenhamii decocto, aut decocto oryzae, aut illa Boerhaavi depellitur. Ne aerem impurum respiciet infans immundities sunt amovendae, et aer cubicoli saepe in dies mutandus.

Quamprimum infantes ad aerem purum transferantur, cutis continuo moderata sit cujus frictio sibiis adactis in hoc modo esse solet.

Opportunum est cutim abluere cum decocto asperis et sulphore, cum balneo tepidulis plus minusve calidis, prout diversa est tempestas, ope conspici abluenda corpora et sicca deinde calidiusque lenis abstergenda. Ubi debiles sint infantes, aqua frigida, et tepidas vinus optime conveniunt, hac ratione fibra corroboratur, et cutis munda evadit. Si comedenda adiant, balneo praemisso tepidulo, facillime exprimentur.

Haec cura dietetica haud raro segetum sanat, non obliviscatur tamen medicos curam therapeutice cui tota et perfecta salus tribuenda.

Salivam evacuari est prima indicatio, hæc per ventriculi debilitatem et per infan-
tium labie laborantium varietatem facillime
hæc ætate gignitur, quapropter interdum va-
mitus, vomitiones adsunt, et quandoque
emetica ipsam necessarium est.

Inter purgantia leuibus extollitur Rheum
electum quod porrigitur sub formæ pulveris
vel infusi dummodo tamen nec irritatio nec
inflammatiō in intestinis adsint, nam tunc
Rheo alia sunt substituenda evacuantia mi-
nora.

In infantibus tenuis Rheum electum por-
rigitur dari granorum 1. vel 2. vel 3.; in
adultioribus et contra ad dosim granorum 5.
6. in die et evacuationes promoveantur: no-
tandum quoque quod hæc super alia purgan-
tia, et hæc dosis super majores melius emo-
lentur in hæc ætate et in hæc morbo gi-
gnant.

Remedia fortiora nimis litescent immo or-
ganis digerentia, quæ virgines adhuc, et ni-
mæ excelsitudine donantur levissime inflam-
mant.

Efficaciora purgantia diarrhoeam gignunt,
per nimis frequens in rebiliis infantibus de-
bilitatem indecoris corporisque emaciam.

Caveat in hac cura medicus a salinis, et
a drasticis. —

Tabes infantilis, peneque Eluviatilis complicatur. Calores tunc aut solos aut cum rheo in pulvere exhibendos.

Ubi necesse sit tabes intestinalis medicis ad remedia fortiora deveniat, nonnulli sales, calores ipse majori dani potestas multum conferunt; erit Jolappum tamen, quæ quævis sit remedium optimum inter purgantia, subito secius ob suam vim irritat, et inflammat fistulam entericam, et colericam hæc inflammatio ad mesentericas glandulas, mesenteridem inducens, diffunditur.

Sit medicus purgationem usui, aliter symptomate curis evadentem.

Radicalis cura quandoque obstat, sed remedia quibus ad hanc consequendam medicus utitur diversæ sunt actione: nonnulli stimulantibus, depressantibus ali, et specificis demum aliqui utantur.

Hæc diversa therapia a variis medicis adhibendo sub tertio studio seligitur, morbus enim in primo et etiam in secundo solis dieteticis rectiliter potest curari. In tertio a contra sub quo conditiones morbois viscerum interiorum non bene agnoscentur, cura pro diversis morbi manifestationibus pro diverso gradu, et pro diversa incussum adhibita therapia institui solet.

Præter purgantis etiam sanguinis locales depletiones et emetica conveniunt.

In ultimo studio morbi quando effluvia est diarrhoea roborantia convenient, sed cauta semper manu sunt adhibenda, sicuti plerumque donec morbus perdatur fistula enterica levi phlogosi destituta, quae haud dubie sub roborantibus una evanesceret.

Reborantia renelli, et dein amaricantia, quae non semper roboranti praedant virtute praestant.

Alii praefiniant bicarbonatem sodae, carbonatem magnesia, magnesiæ ustam, et haec certe non sunt roborantia. Videmus ergo quantum infantilis tabis cura polius empirica quam rationalis esse solet: curantur remediis oppositis naturae, et sanantur aegri a remediis cum purgantibus ab aliis cum roborantibus, et cum purgantibus et roborantibus in simul sumptis. Certum est roborantia curantur sub secundo et tertio studio ubi verum debilitatis signa adint: optima convenient decoctum corticis peruvian, aquae aromatica, aquae rectifera, aqua distillata camomillae in quibus mirabiliter amarorum extractorum solutiones convenient.

Specificis tandem aliis utitur.

Hoffland et Frank addunt remedia compositum ex pulvere baccarum lauri, melle moschatæ et spiritus corvi cervi: expressi auctores ejus compositionem hanc commendare

juvat quando atrox ad secundum vel tertium stadium evadit.

Martialis interna et externa poerecta commendant Angli. Intus prescribunt carbonatam, sulphatam, sed praecipue martiatam ferri solutam: externas quoque eorum non laudant; et balnea martialis non laudant.

Præsentibus nervosis symptomatibus, diarrhoea effluviis, coliquantia, tunc cum symptomatibus cum narcoticis et acidis mineralibus institienda. Sed haec remedia nunquam eorum radicalem ducunt sed tantum magis evanescentia symptomata intelligunt.

FINIS.

THESES DEFENDENDAE.

1.

Ticinesibus libendum et libero pede pugnare tollat.

2.

Substituenda sunt medica secreta medico iudicio aut prohibenda.

3.

Probabilitas absolute necessaria in theoria.

4.

Finis, causa phaenomenorum vitalium dicitur vis.

5.

Organorum duplicatio potius laetis quam securitas.

6.

Finis et motus quotidiani.

7.

Sanitas idem est ac pulchritudo.